



Bilharziose : prise en charge des personnes potentiellement exposées à la bilharziose en Corse à la suite d'un contact avec l'eau de la rivière Cavu

• La pathologie

Affection parasitaire due à un schistosome (*Schistosoma haematobium*) ; le réservoir est l'homme qui élimine les œufs dans les urines. L'homme se contamine par pénétration cutanée des furcocercaires lors d'un contact même bref avec de l'eau douce. Cette contamination nécessite un hôte intermédiaire : le bulin (mollusque d'eau douce).

• Les symptômes

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, toux, pendant la phase d'invasion (plusieurs semaines) pouvant bénéficier d'un traitement symptomatique.
- Signes urinaires (hématurie terminale, cystites à répétition) ou génitaux (hémospermie, douleurs pelviennes, granulomes cutanés ou muqueux périnéaux) pendant la phase d'état, (au-delà de 2-3 mois).

• Le diagnostic et le traitement de la bilharziose permettent :

- Au niveau individuel de diminuer le risque de bilharziose urinaire symptomatique et de complications à long terme (infertilité, insuffisance rénale, néoplasie).
- Au niveau collectif d'interrompre le cycle de la maladie et donc la survenue de nouvelles contaminations.


Population à risque pour laquelle un diagnostic est recommandé :

- **Tout sujet ayant eu un contact cutané même bref avec de l'eau** (baignade, trempage d'un membre, etc.)
- **de la rivière Cavu en Corse du Sud**
- **entre 2011 et 2013 sur une période allant de juin à septembre.**

Les personnes symptomatiques et/ou ayant des expositions répétées (exposition professionnelle par exemple) sont considérées comme prioritaires pour le dépistage.

A noter : une guérison spontanée est parfois possible en cas de contact unique à la différence de la bilharziose chronique de migrants adultes (originaires de zones d'endémie) infectés massivement dans l'enfance.

Conduite à tenir devant une personne exposée



Les laboratoires seront chargés de signaler les cas confirmés à l'ARS et/ou l'InVS qui pourront, le cas échéant, revenir vers vous pour obtenir plus d'informations sur votre patient.

Le Praziquantel ne doit pas être prescrit comme traitement préventif (aucun effet) mais uniquement comme traitement dans les cas de bilharziose confirmée biologiquement.

Suivi des patients exposés et traités :

Il se fait par examen clinique, bandelette urinaire, éosinophilie, recherche de parasites dans les urines. En cas d'échec un nouveau traitement sera renouvelé après 6 mois avec avis spécialisé recommandé.

→ POUR EN SAVOIR PLUS

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
www.sante.gouv.fr/bilharziose.html
Nous suivre sur Twitter : @DGS_MinSante
@Minist_Sante

Institut de veille sanitaire
www.invs.sante.fr
Haut Conseil de la santé publique
www.hcsp.fr

Document réalisé à partir de l'avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au dépistage et au traitement des infections à *Schistosoma haematobium* du 23 mai 2014 : www.hcsp.fr

* Base de données publique des médicaments
www.medicaments.gouv.fr